

Sedazio Aringarria bizitzaren amaieran

Noiz burutzen da?

Sedazio Aringarria bizitzaren amaieran eskaintzen da. Sintoma desberdinek eta/edo ondoez handiak sor ditzakeen eta beste modu batera nahikoa arindu ezin daitekeen sufrimendu jasanezina dagoen kasuetan ematen da.



Mina



Deliria

Itomena, disnea



Sufrimendu existenziala

Zertan datza?

Sufrimendu jasanezina arintzeko gaixoaren kontzientzia maila jaisten da. Midazolama da erabil daitekeen botiketako bat.



Talde arreta

Sedazio Aringarrian esperientzia daukan talde batekin kontsultatu ondoren soilik hasi behar ko litzateke sedazioa. Kasurik konplexuenetan, talde honek gaixoaren ardura daukan taldea aholkatu dezake, baita jarraipenean lagundu ere.



Aurretiazko elkarrizketak eta ondorengo zaintza

Gaixoaren zaintza nahiak erregularri aztertzea eta bere familiakoekin tratamendu eta sedazio aringarriaren aukerari buruz hitz egitea praktika egokia da. Bestalde, maite den pertsonaren heriotzak sufrimendu handia sor dezake eta heriotza ondorengo familia-arreta eskaintzea oso garrantzitsua da.

Proporzionaltasuna

Sedazio Aringarriak gaixo bakoitzean arindu behar den sufrimendu jasanezinarikiko proporzionala izan behar du.

Hainbat eratakioa izan daiteke:

- Azalekoa / Sakona
- Aldizkakoa / Jarraitua

Sedazio Aringarriaren praktika

Praktika mediku honek ez du bizitza laburtu nahi: heriotza modu natural batean gertatzen da. Sedazio aringarria bizitza amaierako sufrimendu jasanezina arintzen du. Sufrimendu hau, sarritan, jendearen kezka izaten da.

Sufrimendua

Sedazioa

Konforta



Nola neurtzen da eraginkortasuna?

Behin gaixoa sedatuta dagoenean, bere ongizatea baloratzen da. Horretarako, adierazten dituen lasaitasun zeinuak behatzen dira eta familiari ere galdetzen zaio.

Aurpegia
Aurpegiera
lasaia

Arnasketa
Lasaia eta ixila

Ahotsa
Ez dauka
bokalizazio
negatiborik

Gorputza
Erlaxatuta