

Palliatív szedáció az élet végén

Mikor végzik?

A palliatív szedáció akkor javasolt, amikor a beteg élete végén csillapíthatatlan testi-lelki tünetei miatt olyan elviselhetetlen szenvedést él át, ami más módon nem enyhíthető hatásosan.



Lelki szenvedés



Fájdalom



Zavartság

Fulladás, nehézlégzés

Mit jelent?

A beteg tudati szintjét csökkenti az elviselhetetlen szenvedés enyhítése céljából. Ilyen hatású gyógyszerre példa a midazolam.



Szakmai ellátó csoport

A palliatív szedáció elkezdésére csak a módszerben jártas szakemberekből álló csoport közös döntése alapján kerülhet sor. Bonyolult esetek kapcsán ez a szakmai csoport tanácsot ad az eljárást közvetlenül végző ellátóknak és segíti a nyomon követést.



Felkészülés és támogatás

Előrehaladott betegség esetén rendszeres időközönként érdemes felmérni a beteg kívánalmait az ellátásával kapcsolatban, valamint beszélni a hozzátartozókkal a lehetséges kezelésekről és a palliatív szedációról. A beteg halála a szerettei számára nagyon fájdalmas lehet, emiatt fontos a gyógyszeres hozzátartozók támogatása.



Fokozatosság

A palliatív szedációt fokozatosan és olyan mértékig kell alkalmazni, hogy a szenvedést megfelelő módon enyhítse.

Lehet

- Felszínes / mély
- Időszakos / Folyamatos

Szenvedés



Szedáció

Nyugodt állapot

Hogyan történik a palliatív szedáció nyomon követése?

Elindítását követően a palliatív szedáció nyomon követése a beteg állapotának és tüneteinek értékelésével, valamint a hozzátartozók véleményének kikérésével történik.

Arc
Nyugodt
arckifejezés



Légzés
Lassú és halk



Hang
Nincs hallható
jele a szenvedésnek



Test
Nyugodt

