

Palliatieve sedatie in de laatste levensfase

Wanneer wordt het toegepast?

Palliatieve sedatie kan worden overwogen om het lijden te verlichten, wanneer in de laatste levensfase ernstige symptomen aanwezig zijn die niet op een andere manier adequaat zijn te behandelen.



Existentieel lijden



Pijn



Delier

Benauwdheid, dyspneu


Wat is het?

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn van de patiënt verlaagd om het lijden te verlichten. Een medicijn wat hiervoor vaak wordt gebruikt is Midazolam.



Team aanpak

De inzet van palliatieve sedatie wordt vooraf besproken binnen het (interdisciplinair) behandelteam. Zo nodig kan er om advies en hulp gevraagd worden bij specialisten met kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg.



Anticiperen en nazorg

Bij een gevorderde ziekte is het van belang om de wensen en behoeften ten aanzien van de laatste levensfase regelmatig te bespreken met de patiënt en familie. Palliatieve sedatie is hier ook een onderdeel van. Daarnaast is de (nazorg) voor naasten belangrijk om de situatie voor hen inzichtelijk en zo draaglijk mogelijk te maken.



Proportionaliteit

De mate van palliatieve sedatie moet proportioneel zijn, wat betekent dat de medicatie afgestemd is op het verlichten van het lijden van de patiënt.

Dit kan op verschillende manieren:

- Oppervlakkig / Diep
- Intermittierend / Continue



Palliatieve sedatie in de praktijk

Palliatieve sedatie valt onder normaal medisch handelen, dat gericht is op het verlichten van lijden van de patiënt met onbehandelbare symptomen. Palliatieve sedatie heeft expliciet niet als doel om het leven te bekorten.

Gezicht
Kalme
gelaatsuitdrukking

Ademhaling
Langzaam
en geluidloos

Stem
Geen negatief
stemgebruik

Lichaam
Ontspannen